

VEJLEDNING - OPERATION I/OMKRING ENDETARMSÅBNINGEN.

Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages, hvis man f.eks. skal fjerne større hæmorider, løs hud efter hæmorider (marisker), bylder eller behandle en kronisk revne i endetarmsåbningen, som ikke heler på medicinsk behandling.

Før operationen

Får De blodfortyndende medicin, skal dette oplyses i god tid før operationen. Mikrolax anvendes ca. 2 timer før operationen.

Operationen

Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via et stik i selve marisken/hæmoriden eller i omgivelserne omkring endetarmsåbningen.

Efter operationen

Mod smerter: De første 2-3 dage efter operationen kan være smertefulde, hvorfor afføringen skal blødgøres de følgende dage med 2 tabletter Magnesia a' 500 mg til natten. Som smertestillende kan tages Paracetamol 1 g x 4 og/eller, hvis det skønnes nødvendigt, Ibuprofen 600 mg x 3 daglig, som vil blive udleveret i klinikken.

Forbinding: Operationsåret rengøres bedst ved håndbrusning (altid efter toiletbesøg), indtil operationsområdet er smertefrit. Evt. kan kolde omslag anvendes (ispose el. lign.) både for at standse eventuel blødning, mindske hævelse samt for at reducere eventuelle smerter. Der skal ikke fjernes sting.

Sygemelding: Sygemelding kan være nødvendig et par dage.

Komplikationer: Blødning og infektion forekommer sjældent.

Søglæge

Ved større blødning eller tegn på betændelse skal kirurgen, vagtlæge eller skadestue straks kontaktes.