

# **PATIENTVEJLEDNING – FORHUDSFORSNÆVRING.**

## **Før operationen**

Før ankomst til klinikken, vaskes ydre kønsdele grundigt.  
Medbring et par “fastsiddende/stramme” underbukser.

## **Operationen**

Lokalbedøvelse af penis.  
Forhuden og den snævre ring fjernes, hvorefter den resterende hud syes med tråde, der forsvinder af sig selv.  
Der anlægges forbindelse, som skal sidde i 1 døgn.

## **Efter operationen**

Så vidt muligt holdes penis opad i nogle dage.

*Mod smerter:* Lokalbedøvelsen holder ca. 1-2 timer, herefter kan suppleres med Ibumetin 600 mg x 3 daglig (udleveres i klinikken) kombineret med håndkøbsmedicin, f.eks. Paracetamol.

*Forbinding:* Forbindingen skal helst blive siddende i 1 døgn og herefter holdes såret rent med håndbrusning. Såret vil være hævet de første 2-3 uger.

*Sygemelding:* 1-3 dage efter behov.

## **Komplikationer**

I sjældne tilfælde kan opstå behandlingskrævende blødning og/eller betændelse.

## **Søg læge**

Ved større blødning eller tegn på betændelse skal klinikken/vagtlæge eller skadestue straks kontaktes.