

# **PATIENTVEJLEDNING – STERILISATION AF MÆND.**

## **Før operationen**

Barbér hårene af pungen og lidt ud til siderne, og tag et brusebad så alle hår er væk. Hjemtransport arrangeres med pårørende, taxa eller andre.

## **Operationen**

Indgrebet udføres i lokalbedøvelse. Der kan være et kortvarigt ubehageligt træk i pungen og op i bughulen, når man skal frigøre sædstrengen fra andet væv. Der fjernes et stykke af sædstrengen på begge sider.

## **Efter operationen**

*Modsmertes:* Almindelig håndkøbsmedicin, f.eks Paracetamol eller Ibuprofen.

*Forbinding:* Eventuel forbinding fjernes dagen efter operationen.

*Sygemelding:* 1-2 dage.

## **Komplikationer**

Det er ikke usædvanligt, at der kommer en blodansamling i pungen, eller at der sker en blodudtrædning under huden på pungen eller penis, som kan medføre mørkfarvning. Dette forsvinder igen af sig selv og er uden betydning. I sjældne tilfælde kan der opstå en lille knude på den afbrudte sædstreng.

## **Søg læge**

Ved større blodansamling eller tegn på betændelse skal kirurgen/klinikken, vagtlæge eller skadestue kontaktes.

## **VIGTIGT!**

**Der skal hos egen læge tages sædprøve to måneder efter indgrebet. Der bør anvendes antikonception til sædprøven er fundet negativ, dvs uden sædceller.**