

PATIENTVEJLEDNING - GASTROSKOPI.

Undersøgelsen udføres via næsen eller munden med en lang bøjelig kikkert, hvor igennem der kan føres instrumenter til udtagning af vævsprøver. For at folde mavesækken ud, blæses der luft i mavesækken. Undersøgelsen foretages for at afsløre, om der er forandringer i mavesæk eller spiserør (sår, betændelse, forsnævring eller kræft).

Før undersøgelsen

De skal faste i 6 timer før undersøgelsen, men må godt drikke lidt vand indtil 2 timer før undersøgelsen. Eventuel nødvendig medicin kan indtages med en mundfuld vand. Hvis de får mavesårsmedicin bedes De undlade at tage medicinen 1 uge før undersøgelsen, hvis dette er muligt, da det ellers kan være vanskeligt at påvise eventuelle bakterier. De kan i stedet, indtil 1 døgn før undersøgelsen, tage håndkøbsmedicin mod syre (syreneutraliserende flydende medicin og/eller tyggetabletter).

Undersøgelsen

Næsen/svælget bliver lokalbedøvet med spray. Undersøgelsen foregår i venstre sideleje. Kikkerten føres op i næsen/ind i munden, hvorefter De bliver bedt om at lave et par synkebevægelser, for at kikkerten kan komme ned i spiserøret. Der er masser af pladstil at trække vejret, både gennem næse og/eller mund. Undersøgelsen varer ca. 3 minutter. De fleste patienter finder undersøgelsen let ubehagelig på grund af opkastningsreflekser. Enkelte finder undersøgelsen mere ubehagelig og kan have behov for beroligende medicin. Dette gives som en indsprøjtning i en blodåre.

Efter undersøgelsen

Hvis der er givet lokalbedøvelse med spray, må De først spise og drikke efter 1 time på grund af risiko for at få væske/mad i luftrøret. Hvis De har fået beroligende medicin, må De ikke arbejde eller køre bil samme dag, og De skal sørge for hjemtransport (påørende, taxi el. lign.). Hvis De ikke har fået beroligende medicin, kan De tage på arbejde.

Meget sjældent kan opstå perforation af spiserør/mavesæk. Ved stærke smerter, blødning og/eller feber, skal De straks kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestue.