

# **PATIENTVEJLEDNING - GENEREL VEJLEDNING TIL OPERATION I LOKALBEDØVELSE.**

## **Før operationen**

Hvis De har pacemaker eller er i behandling med blodfortyndende medicin skal dette oplyses i god tid før operationen. Undlad at smøre creme på huden. Fjern eventuelt hår dagen forinden i et område omkring operationsstedet.

## **Operationen**

Huden desinficeres med klorhexidinsprit. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål – det kan svie og spænde lidt i huden et par minutter herefter. Under operationen kan man mærke berøring, men ikke smerte. Såret lukkes med en tråd, der oftest skal fjernes efter 7-14 dage i klinikken eller hos egenlæge.

## **Efter operationen**

*Mod smerter:* Lokalbedøvelsen holder ca. 2 timer. Med mindre andet er aftalt, kan der mod smerter tages almindelige håndkøbspræparater, f.eks Paracetamol eller Ibuprofen.

*Forbinding:* Forbindingen fjernes efter 1 døgn (med mindre andet er aftalt), og brusebad er tilladt. Såret har bedst af at få luft, så det er kun hvis evt. tøj generer såret, at det kan tildækkes med almindeligt plaster i dagtimerne.

*Restriktioner:* Med mindre andet er aftalt, er der ingen restriktioner i hvad man må, dog frarådes karbad, havvand, svømmehal o.lign., indtil trådene er fjernet.

## **Komplikationer**

I sjældne tilfælde kommer der blodansamling, som oftest forsvinder af sig selv efter nogle dage til uger.

I yderst sjældne tilfælde kan der opstå betændelse i såret. I meget sjældne tilfælde bliver ar grimme og fortykkede. I yderst sjældne tilfælde udvikles en overfølsomhedsreaktion mod lokalbedøvelse. Dette kræver hurtig behandling eller eventuel indlæggelse på hospital.

## **Søg læge:**

Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme, hævelse, temperatur over 38,5) skal De kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestue.